

I		II	III
nasturtium	CV.	476,22 H	MM ₂ V
neptum	CV. BE. W.	476,17 H	LAMEM ₂ S
olisatum	CV.	505,26 H	LV
papaver	CV. W. G.	482,59 H	ESV
parduna	CV.	—	—
pastenaca	CV. G.	476,53 Anm.	LAMEM ₂ VS
pepo	CV. W.	483,13 H	LAM ₂ S
petresilenum	CV. BE. G.	482,50 H	E
pisi (maurisci)	CV.)	507,7	E
porri	CV. BE. G.	505,39 H	LMEM ₂ SV
puledium	CV. W.	505,37 H	LAMM ₂ SVE
radix	CV. G.	507,23 H	LAMEM ₂ SV
ravacaula	CV. BE.	574,28 —	—
raphanus	W.	490,41 H	LAESV (?)
rosa	CV. G. W.	507,46 H	EM ₂ V
ros marinum	CV. G. (s)	507,22 P	—
ruta	CV. BE. W. G.	483,33 H	LAMEM ₂ SV
salvia	CV. BE. W. G.	508,4 HP	—
satureia	CV. BE. G.	483,55 H	AMEM ₂ VS
savina	CV. BE.	484,20 P	V
sclareia	CV. BE. W.	508,53	AM (?)
silum	CV. (s)	509, 32 = 531,53 H	ES
sinapis	CV.	491,20 H	EM ₂ SV
sisimbrium	CV. G.	508,42 HP	ME
solsequium	CV. BE.	484,4 H	—
squilla	CV.	532,2	—
tanazita	CV. (ambrosia) W. BE.	469,27 H	—
uniones	CV.	—	S
vulgigina	CV.	485,5 —	—
warentia	CV.	511, 7 = 429,30 H (Anm.7)	—
vettonica	BE. W.	486 P	E (betonica)
viola nigella	W.	545,49	—

2. B ä u m e

amandalarius	CV. G.	42,10	MSV (amygdalum)
avellanarius	CV. BE. G.	490,12 H	MES
castanearius	CV. G.	468,52	LESV
cotonarius	CV. BE. G.	44,17	LE
figus	CV. G.	473,29 H	LMES
laurus	CV. G.	502,12 H	ESV
malus	CV. G.	466,22	LME
mespilarius	CV. BE. G.	504,34 H	L